

**Contexte :** Cette communication affichée a pour but de mettre à jour les facteurs psychologiques impliqués dans les comportements d'observance chez les femmes ostéoporotiques. Sur la base du modèle de Leventhal, ce travail qualitatif cible plus particulièrement la représentation du traitement anti-ostéoporotique par les patientes, afin de mieux comprendre la manière dont elles perçoivent le traitement prescrit. Bon nombre de femmes ostéoporotiques se questionnent en effet sur le bien-fondé et la nécessité d'un traitement en raison du caractère asymptomatique de la maladie.

**Méthode :** Quatorze entretiens semi-structurés ont été réalisés auprès de femmes de plus de 50 ans présentant une ostéoporose post-ménopausique, sous traitement per os ou intraveineuse, ou encore sous supplémentation vitamino-calcique. Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits, et les analyses thématiques ont été effectuées à l'aide du logiciel Nvivo 10, à partir d'une grille d'entretien préétablie mettant à jour les représentations des patientes ostéoporotiques.

**Résultats :** L'analyse thématique met en évidence la nature des représentations des patientes selon le type de traitement. Les patientes sous traitement par voie intraveineuse semblent avoir plus de représentations, percevant davantage les bénéfices (10 occurrences) et la praticité du traitement (13 occurrences) que les patientes sous traitement per os et supplémentation vitamino-calcique. Ces dernières expriment également plus d'incertitude liée à la prise de leur traitement médicamenteux.

**Discussion :** Ces résultats préliminaires soulignent le rôle clé de la perception des traitements sur les comportements d'observance d'une part, et celui de l'incertitude, évoquée notamment par les patientes bénéficiant d'un traitement par voie intraveineuse, sur leur représentation du traitement d'autre part. L'ensemble des résultats de cette étude permet de mieux cibler les facteurs susceptibles de faire obstacle à l'observance thérapeutique. Ils vont dans le sens de la littérature qui montre que la prise d'un traitement anti-ostéoporotique suscite des inquiétudes et de l'anxiété, susceptibles de conduire à l'arrêt du traitement qu'elles considèrent plus délétères que leur maladie asymptomatique.